

Phá thai bằng thuốc gây nên bệnh vô sinh không? một số biến chứng khả năng gặp phải

Uống thuốc phá thai có gây nên vô sinh hiếm muộn không, theo chuyên gia tại phòng khám 11 Thái Hà dùng thuốc đình chỉ thai kỳ mang đến một số hệ lụy khôn lường, có thể dẫn tới vô sinh. Những biến chứng có thể gặp phải khi dùng thuốc đình chỉ thai nghén nhiều lần chảy máu tử tử cung, bội nhiễm, nguy cơ ung thư vú, mất chức năng sinh sản.



1. Sự thật về phá thai nội khoa bị gây bệnh vô sinh

Uống thuốc phá thai là việc dùng thuốc nhằm hoàn tất sự tiến triển của thời kỳ mang thai. Đây là phẫu thuật uống thuốc phá thai không cần can thiệp phẫu thuật. Thuốc bỏ thai sau thời điểm vào thân thể sẽ gây những rối loạn, làm đình chỉ sự sống của thai nhi. Mặt khác, gây ra một số cơn co bóp dạ con, khiến sản phụ “sảy thai một giải pháp thiên nhiên.

Với những chị em phụ nữ, uống thuốc ngừa thai một hoặc nhiều lần sẽ có những nguy cơ mắc vô sinh - hiếm muộn khác nhau. Cụ thể là:

Đình chỉ thai kỳ lần 1

Chị em phụ nữ mới chỉ uống thuốc phá thai 1 lần thường không gặp vấn đề gì có mối liên quan đến sinh con về sau. Lúc này, tử cung mới chỉ bị ảnh hưởng một chút, sau thời điểm ngắn sẽ phục hồi lại tình trạng như đầu tiên. Người phụ nữ có thể yên tâm về thiên chức làm mẹ về sau.

Bỏ thai lần thứ 2

Nếu không may bị “vỡ kế hoạch” lần 2 thì bạn cũng đừng quá hoang mang. Hiện nay, việc nạo phá thai khi bào thai vừa mới hình thành không quá tác động đến sức khỏe cơ thể. Câu hỏi nặng nề nhất mà người mẹ phải đương đầu là áp lực về mặt tâm trạng.

Tuy nhiên, nếu như 2 lần đình chỉ thai kỳ tiếp diễn quá sát nhau (dưới 12 tuần), thai phụ có thể mắc phải hiện trạng bất ổn về nội tiết và thương tổn dạ con. Điều này cũng khả năng là lí do khiến vô sinh - hiếm muộn trong thời gian sắp tới.

Bỏ thai lần ba

Uống thuốc ngừa thai được tiếp diễn đến lần ba, mẹ bầu phải cực kỳ “dè chừng” bởi rất có thể bạn sẽ phải đối diện với vô sinh – hiếm muộn. Việc dung nạp một lượng lớn thuốc đình chỉ thai nghén sẽ khiến hormone trong cơ thể nữ giới đổi thay khiến, khó khả năng điều chỉnh trở lại.

Bên cạnh đó, ảnh hưởng của nhiều lần đình chỉ thai nghén khiến thành tử cung mỏng đi, tạo bất tiện cho những lần sinh đẻ tiếp tục.

Sử dụng thuốc để đình chỉ thai kỳ nhẹ nhàng hơn so với cách nạo hút, nên được nhiều người nghĩ đến lúc đầu. Thế nhưng, nếu muốn có thể tiếp tục mang bầu, chị em phụ nữ cần “giữ gìn” để giảm thiểu lâm vào tình thế khó xử, có khi còn ảnh hưởng đến hành vi mẹ trong tương lai.

<https://phathaihaiha.webflow.io/post/pha-thai-co-anh-huong-gi-khong>

2. Một số triệu chứng vô sinh sau khi phá thai bằng thuốc

Sau đây là những một vài triệu chứng chỉ ra rằng bạn đang gặp nguy hiểm khi phá thai nội khoa:

- Nhiệt độ cơ thể tăng cao liên tục, không thuyên giảm:

Sốt nhẹ & cảm nhận hơi gai toàn thân là phản ứng bình thường của cơ thể sau thời điểm tiếp thụ thuốc. Nhưng mà, nếu như sốt cao quá 38 độ, cơ thể rời rã, đầu óc chóng mặt, bạn cần thiết phải gặp bác sĩ chuyên khoa ngay.

Lý do có thể là hiện tượng dị ứng với thuốc dùng trong phá thai, hoặc trầm trọng hơn là trạng thái viêm nhiễm.

- Chảy máu âm đạo:

Máu tiết ra ở "cô bé" nhiều như kinh nguyệt ở một số ngày giữa chu kỳ, thậm chí cao hơn. Nếu không giải quyết kịp thời sẽ nhất thiết cắt tử cung, vào thời gian này cơ hội sinh đẻ vĩnh viễn sẽ không còn.

- Chất nhầy âm đạo, khí hư lạ thường:

Ra nhiều huyết trắng, không ở trạng thái trong suốt là triệu chứng của những bệnh phụ khoa. Sau khi bỏ thai, trong trường hợp không giữ sạch sẽ, phải nữ rất hay bị viêm nhiễm âm đạo, viêm cổ tử cung,...

- Chu kỳ kinh nguyệt không đều trong tương lai:

Khoảng 2 tháng sau khi phá thai, kinh nguyệt sẽ xuất hiện. Nếu như các ngày đèn đỏ xuất hiện thất thường, khác biệt thời điểm trước thì sản phụ cần thiết phải được khám bệnh ngay. Đây là hậu quả của việc thân thể không trở lại tình trạng điều hòa, gây xáo trộn những ngày có kinh nguyệt.

Địa chỉ phá thai ở hà nội <https://phathaihaiha.webflow.io/post/co-so-pha-thai-an-toan-o-ha-noi>

Phk Thái Hà <https://phathaihaiha.webflow.io/post/phong-kham-da-khoa-thai-ha>

3. Các di chứng có thể gặp phải nếu như phá thai bằng thuốc

nhiều lần

- Rủi ro băng huyết:

Băng huyết là di chứng phổ biến nhất khi đình chỉ thai nghén nội khoa. Theo tầm khoảng cứ 100 ca băng huyết sẽ có khoảng 25 ca qua đời.

Băng huyết là hiện tượng cực kì hậu quả khi sản phụ bị mất một lượng máu lớn do thành dạ con bị vỡ. Nếu như không nên đưa đi cấp cứu kịp thời vô cùng có thể sẽ qua đời.

- Nguy cơ viêm nhiễm:

Hai dạng viêm nhiễm khi uống thuốc phá thai có khả năng mắc phải đó là nhiễm khuẩn cơ quan sinh sản & viêm nhiễm máu. Tác nhân vượt bậc của hiện trạng hậu quả này là do dây rốn, thai nhi chưa quá đầy ra hết, hiện đang đọng lại trong buồng dạ con gây nhiễm khuẩn.

Mặt khác, âm hộ chớ nên vệ sinh sạch sẽ trong những ngày xung huyết cũng là nguyên nhân khiến vi khuẩn thâm nhập, gây nên viêm nhiễm phụ khoa.

- Khả năng ung thư vú:

Phụ nữ dùng chất gây nghiện sảy thai nhiều lần có khả năng ung thư vú cao gấp 2 lần một số phụ nữ khác.

- Rủi ro mất sức khỏe sinh sản:

Dùng quá nhiều phá thai nội khoa nhiều lần khả năng gây ra tác động đến nội tiết, dẫn đến hiện trạng rối loạn thời điểm trứng rụng. Trứng khả năng rụng sớm hoặc muộn một biện pháp lạ thường, gây trở ngại trong việc đậu thai.

Chi phí phá thai <https://phathaithaiha.webflow.io/post/pha-thai-1-thang-tuoi-bang-thuoc-va-chi-phi>

11 Thái Hà đồng đa Hà Nội <https://phongkhamthaiha.org>

4. Một số lưu ý giúp phá thai nội khoa an toàn

Chăm dứt thời kỳ mang thai nội khoa tuy hiếm gặp rủi ro, nhưng sản phụ cũng cần đặc biệt lưu tâm một vài điểm như sau:

- Tránh tự tiện uống thuốc:

Bà bầu khi không thể giữ thai cần đi khám bác sĩ, trung tâm y tế để kiểm tra & tiến hành phá thai theo các bước toàn bộ như trên. Quá trình bỏ thai phải được quan sát thường xuyên bởi thầy thuốc chuyên khoa sản khoa, bảo đảm có cách thức khắc phục ngay từ giai đoạn đầu khi gặp di chứng (chảy máu từ tử cung, sót thai,...)

- Thu xếp thời gian tĩnh dưỡng, hoạt động thể thao:

Trong khi phá thai nội khoa, sản phụ cần được tĩnh dưỡng nhiều, tránh bê vác nặng, đi ngoài thang,...gây ảnh hưởng đến tử cung.

- Menu:

Cho dù đình chỉ thai kỳ theo giải pháp nào cũng khiến thân thể thiếu máu một lượng máu lớn. Chính vì, cần xúc tác bổ sung các loại đồ ăn như thịt đỏ, trứng, sữa... để bù lại lượng máu thân thể vừa không đủ.

Nội dung trên là tất cả những tin tức câu trả lời cho nghi vấn uống thuốc ngừa thai có gây vô sinh không? Để làm giảm nguy cơ tác động đến sức khỏe thể chất, sản phụ cần chọn lọc khu vực chất lượng cao để được thăm khám trước khi phá thai. Nếu như bạn còn bất kỳ phân vân nào, hãy liên lạc ngay với một số bác sĩ sản khoa của phòng khám đa khoa Thái Hà để được giúp đỡ.